



Im Subimago-Stadium habe ich Ihnen dieses Weibchen schon vorgestellt. Hier sehen Sie nochmals das gleiche Tier, **Heptagenia sulphurea** mit einer Körpergröße von 9 mm im Imago-Stadium. Sogleich nach der letzten Häutung erscheinen diese Eintagsfliegen am Körper eher blass gelb, dunkeln aber nach mehreren Minuten erkennbar nach. Wie schon erwähnt, ist das Vorkommen dieser Art sehr hoch. Überall wo die Bedingungen für Steinklammerer ideal sind, bezieht auch sie meistens Stellung. Allerdings, in ganz kleinen, steinigen Bächen, nahe an Waldrändern mit ganz klarem Wasser, wo andere Steinklammerertypen vorkommen, konnte ich noch nie eine Heptagenia *sulphurea* ausfindig machen. Aber vielleicht täusche ich mich auch diesbezüglich. Denken Sie daran liebe Leser/innen, wenn Sie eine Gelbe vor den Augen haben, ist sie nur dann eine *-sulphurea*, wenn die Augen einen Blauton aufweisen.

Ihr Werner Gysin

Steckbrief:

Ordnung: Ephemeroptera  
Familie: Heptageniidae  
Gattung: Heptagenia  
Art: Heptagenia *sulfurea*